



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

BIU Santé
Médecine
Paris

QUÆSTIO MEDICA

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS

*manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis decimâ-septimâ
mensis Januarii, anno Domini M. DCC. LXXXVIII.*

M. STEPHANO-LUDOVICO GEOFFROI, Equite,
Regi à Consiliis & Secretis, Doctore Medico, Præside.

An in omni hæmorrhagiâ adstringentia intus nociva?

I.

TANTUS est medicamentorum è triplici regno tum minerali, tum vegetabili, tum animali depromptorum supellex, ut propter hunc immensum fere numerum, nec diligentissimus ad singulorum peculiarem cognitionem attingere

A

queat. Præterea, nihil difficilius, nihil arduum magis; quam veras & sinceras
 cujusque medicamenti proprietates, virtutes, & modum in corpore agendi pe-
 nitus detegere & assignare. Hinc haud inconsulte asseri potest, non tam labo-
 randum superesse Medico ac desudandum, ut nova, investiget, detegat com-
 ponat-ve remedia, quam ut ex tam immensâ mole & inconcinnâ farragine
 medicamentorum, quibus ars salutaris referta & quasi oppressa obruitur, hæc eli-
 gat, quorum facultates viresque indubiâ experienciâ penitus clariusque cognitæ
 habeat & perspectas; ut & variorum quibus fragilis mortalium vita continuo obsi-
 detur, morborum historias, causas, genuinamque indolem sedulo perscrutetur &
 probe cognoscat. Tunc potens erit Clinicus ea afferre, & in usum proponere,
 quæ morbo & ægrotantis constitutioni apprimè congruant. Num hæc cuncta tam
 varia, tam composita medicamenta, quibus tot pharmacopolia referta sunt &
 onusta, virtutibus, facultatibusque gaudeant? quæ illis à veteribus, nostræ-ve æta-
 tis Medicis tribuuntur. Nonne per plurima, non solum inutilia, sed potius noxia
 evadunt, his ipsis in morbis, quibus curandis tollendis-ve plerumque commen-
 dantur. Quot etenim, à multis rei medicæ Scriptoribus, huic vel isto morbo, ceu
 specifica, quam maximè jactata, quorum effectus efficaciam eis adscriptæ minimè re-
 spondeant? Quot quorum efficacia non solum dubia, sed & planè nulla quotidie, atten-
 tiori observatione detegitur? Quædam nostræ assertionis probationi accedant exem-
 pla. Quid etenim expectandum esset, de usu pulveris hyacynthi, granati, saphiri
 & aliorum lapidum pretiosorum, quos inter non dubiæ virtutis remedia veteres Me-
 dici consecraverant, & quos e medicamentorum numero & compositione peritior
 saniorque doctrina delevit. Quid ab innumeris aliis substantiis? Quæ nisi noxia,
 saltem futilia à Medicis integræ doctrinæ existimantur. Quid verbi gratiâ sta-
 tuendum, de valerianâ, à multis, adversus affectus epilepticos, tanquam mirâ
 virtute gaudente tantoperè laudatâ? Vir cui fides adhibenda, in re medicâ peri-
 tus, hanc stirpem, centum epilepsiâ tentatis, sub omni formâ, ex diversis
 regionibus pepitam administravit; attamen vix uno ex ægrotantium numero, vel
 levissimum attulit levamen; hinc nonne rectè concludendum, illius virtutem
 antiepilepticam pro nulla computari posse? Quid de cicuiâ, à Doct. Storch,
 adversus cancrum, tantoperè decantatâ? Si fides hujusce Medici experimentis
 adhiberetur, nullum certè remedium evidentiiori ad cancrum sanandum virtute
 polleret. At interrogentur varia & repetita apud nos de hocce medicamento
 experimenta; istius plantæ variis præparationibus adhibitis, vel etiam ex vende-
 bonâ allatis nullum hocce malo tentatum adhuc reipsâ sanatum fuisse constat.
 Sic perplurima ad hanc sententiam confirmandam afferri possent. Non tantummodo
 inter tot medicamenta, quibus variæ materiæ medicæ constantur, perplura,
 efficaciam & dotibus eis adscriptis minimè pollent, sed & non perpauca, vir-
 tute donantur & facultate omnino contrariâ indoli & genio morborum, in
 quibus sæpè sæpius præscribuntur. Talia nobis videntur adstringentia; frequen-
 tissimus est illorum usus in hæmorrhagiis: consideratis verò & attentè per-
 pensis hæmorrhagiarum causis & symptomatibus; illorum usus, nedum profi-
 cuus, quàm maximè noxius esse invictè patebit. Ut nostræ propositionis veri-
 tas demonstretur, nobis exponendum venit, hæmorrhagiarum in genere causas,
 varias species, indicationes implendas, adstringentium rationem agendi phy-

cam in œconomiâ animali, & effectus quos in corpore hæc medicamenta producere reipsa valent.

I I.

PER hæmorrhagiam intelligunt Medici sanguinis fluxum à qualibet parte fluentis: crebro è naribus, bronchiis, ventriculo & intestinis sanguis erumpit; sic & è genitalibus utriusque sexûs, è vasis hæmorrhoidalibus & cæteris vasis varicosis, è dentium alveolis, è vulneribus recentibus, & etiam ex ulceribus: aliquando ex aliis partibus, sed rarius & parcius. Sanioris doctrinæ Medici, duplex hæmorrhagiarum genus agnoscunt; etenim si ritè & sedulò perpendantur variæ circumstantiæ in quibus se produnt hæmorrhagiæ, variaque illarum phœnomena & symptomata; rectè, ni fallimur, hæmorrhagiæ in passivas & in activas secerni possunt. Hæmorrhagia passiva dicitur, quæ à causâ externâ, vel à debilitate nervosâ & relaxatione, nullâ comitante pyrexia, accelerato minimè sanguinis motu, vel pulsu, merè pender. Verbi gratiâ, à mechanicâ venæ aut arteriæ alicujus sectione & apertura, ne auctâ quidem actione vasorum ex quibus sanguis erumpit. Hæmorrhagia activa illa est, quæ à causâ internâ progignitur; id est à rarefactione & turgescentiâ sanguinis concomitante pyrexia, accelerato motu sanguinis & pulsu; à congestionem in aliquâ parte, à fluxione sanguinis versus partem aliquam determinatam, à conversione motûs sanguinis ab extra ad intus, ab inæqualitate circulationis. Hæc etenim eveniunt, quando quædam corporis partes præsertim extremæ & à corde remotiores, intensiori fibrarum strictione & contractione, ita angustantur, ut sanguis per venas ad cor redire nequeat, resistentiâ jamjam crescente, in ratione appulsus sanguinis sub quâque cordis systole, sanguis ruber intromittitur in vasa, quæ tantummodo antea admittebant lymphaticum humorem, illorum parietes plus justò distendit, tandemque aperiuntur extremitates, sanguinemque fundunt. Has esse veras hæmorrhagiarum causas compertum habebimus, si varia symptomata & phœnomena, quæ illas antecedere solent, perpendere sedulò libeat. Priusquam etenim appareat hæmorrhagia, varia sese produnt motûs febrilis indicia, varia plethoræ, congestionis & tensionis signa, circa partes ex quibus fluendus est sanguis: videlicet illud obvium observandum venit, in cujuscunque generis hæmorrhagiis, tam salutaribus sive criticis, quam pernicialibus, sive symptomaticis. Antequam verò menstrualis in fœminis & hæmorrhoidalis in viris effusio sanguinis prodeat; nonne inferiora refrigescunt, cutis constringitur, in dorso circa pubem & sacrum percipitur dolor, artus lassantur, genæ gracilescent pallentque, demum pulsus intenditur, tunc fluit sanguis. Sic & ante è naribus stillicidium, extremæ & inferiores partes quoque frigent, facies verò rubet, tumet, temporum vasa intensius saliunt, gravativo dolore tentatur caput, aucto & accelerato arteriarum pulsu, sanguis stillat. Hæmoptysim porrò nonnunquam, antecedunt & extremarum partium, præsertim pedum frigus, lassitudo, flatus in abdomine, alvi adstrictio, pectoris oppressio, respiratio difficilis, rigor totius corporis. Ipse vomitus cruentus & nigri cruoris per anum secessus, necnon mictus cruentus, nunquam accidunt, nisi præcesserint, in abdomine spasmi, circa dorsum dolor, constipatio, cum cutis & exter-

narum partium refrigeratione & detumescentiâ, arteriis citatius duriusque ad tactum micantibus. Quanquam hæmorrhagiæ plethoricos & sanguineâ temperie donatos aliquando invadant, & præcipuè caput exerant verno tempore vel incipiente æstate; tamen causa proxima cujuscumque hæmorrhagiæ, attentè pensatatis variis symptomatibus illas vel præcedentibus, vel concomitantibus, non videtur esse nimia copia boni, consistentis, fibrosi & purpureo colore donati sanguinis: ne ab illâ quidem generali & sincerâ plethorâ, hæmorrhagiæ produci possunt. Hi etenim in quibus existit hæc plethora, fibrosum, robustum corpus habent. Solidâ & tenaci texturâ vasa prædita sunt, difficilè cedunt & extenduntur; validè resistunt, & nunquam nisi à causâ externâ disrumpuntur: præterea constat observatione istos homines rarissimè pati sanguinis excretiones. Si quidem à solâ plethorâ generali & sincerâ producerentur hæmorrhagiæ; effluxâ ingenti sanguinis copiâ, minutâ consequenter plethorâ sponte desineret hæmorrhagia. Attamen id plerumque non sic evenit: adhibitis interdum pluribus sanguinis missionibus, sæpè sæpius recrudescit sanguinis effluxio: rectè igitur aliæ hæmorrhagiis causæ assignantur. Alia quoque præter illas de quibus supra dictum est, causa hæmorrhagiarum, cadaverum sectione detegitur; in vasorum obstructione, in viscerum infarctu & induratione, quæ liberiori sanguinis cursui obices ponunt: in hoc casu id evenit, quod observamus in machinis hydraulicis, obstructis quibusdam canalibus, fluidum per reliquos canales liberos majori impetu & celeritate erumpit: sic in corpore nostro, quando per venas cujusdam partis spasmo strictas vel obstructas, non liberè transire & versus cor deferri potest sanguis; vis & impetus eum impellens crescit resistentiâ, in ramis & ramusculis arteriosis, qui citò itâ distenduntur, ut sanguini erumpenti liberam præbeant portam.

I I I.

NON solum symptomata varia, & phænomena, quæ varias hæmorrhagarum concomitantur species, invictè probant, illas potius produci, à spasmo, à stricturis quarumdam partium spasmodicis, ab infarctu, & obstructione, à fluxione sanguinis versus quasdam corporis partes; quam à verâ & sincerâ plethorâ; sed id quoque confirmatur effectibus, quos quædam remedia, in pluribus casibus adhibita produxere. Legitur etenim apud Forestum, observat. 14, lib. 13, hæmorrhagiam è naribus, quæ adhibitis incassum omnis generis remediis minimè sisteretur; applicatis verò cucurbitis supra duos pedes, dictum mirum præter spem sistatam fuisse. In hoc casu certè hæmorrhagia nequaquam ortum ducebat à nimia sanguinis copiâ, sed à spasmo, quo sanguinis fluxio versus partes superiores determinata erat: soluto autem spasmo cucurbitarum applicatione, sistata fuit. Hujus generis observatio legitur apud Zacutum Lusitanum, lib. 1 Praxis admir. observat. 66. refert se ipsum desperatam hæmorrhagiam nullisque remediis cedentem, appposito cauterio actuali in utrâque plantâ pedum; cohibuisse. Alio asserit hocce remedium similem habuisse successum, in magnâ sanguinis excretionem per os: omnibus remediis & adstringentibus quidem parti frustra admotis, cauterio actuali in eadem parte pedis indito, fluxus sanguinis omnino cessavit.

Ex his quæ exposuimus de naturâ cuiuscunque hæmorrhagiæ, de causis variis & de symptomatibus, illas comitantibus, curatoria facillimæ eruntur indicationes. In eo potissimum versantur ut ea adhibeantur remedia, quæ geminas morbi causas tollere & extirpare, vel saltem debilitare valeant.

Hæmorrhagia, à spasmò, à constrictione totius systematis vasculosi pendeat; sistendus spasmus solutioque determinanda. A fluxione versus aliquam partem; sanguis à parte versus quam sit fluxio derivendus & alio adducendus: à congestione, ab obstructione vel infarctu; congestio solvenda, obstructions & infarctus remediis accomodatis referendi & tollendi. A plethorâ vel generali vel locali; medio congruo minuenda. Has-ne verò indicationes implere valent adstringentia? Minimè quidem; probè cognito pensitatioque modo, quo agunt in œconomia animali, nulum nisi, hisce indicationibus omnino contrarium, & quam maximè nocuum producere queunt effectum. Medicamenta enim quæ virtute adstringente donantur, duplici modo vim suam in corpore viventi exercere intelliguntur, intus sumpta, vim suam exerunt vel in solida, vel in fluida, vel in utraque simul. Primo quidem effectum præstant in membranis, oris, œsophagi, ventriculi, tubique intestinalis: appositione immediatâ particularum substantiæ adstringentis, fibrillæ irritantur, punguntur, constringuntur, decurtantur, diameter vasorum minuitur. Pendeat tunc hæmorrhagia vel à plethorâ, vel à fluxione spasmò orâ, vel ab obstructione: vi adstringentium assumptorum constricção textu vasculoso partium in quibus agunt, spasmus major fit, plethora relativè augetur, sanguis ex parte in quâ existit remedii actio, versus aliam partem præsertim debiliorem propellitur congestione audâ, fluxio ad modum crescit vel augmentum sumere debet. Si supponis è contrâ adstringentia potius in fluida, quam in solidâ immediatè operari. Vis eorum Chemica, est fluida animalia extra corpus inspissare & cogere. Vix aliter agunt in œconomia animali; inspissant chylum, lympham coagulant; dumque migrant in sanguinem ipsi demunt fluiditatem; vitalibus secretoriis & excretoriis motibus quam maximè adversa sunt; fluxilesque humores inspissando, ad circuitum per minima vasa ineptos & ad stagnationem aptissimos reddunt; ideo viscera abdominis ad obstructions disponunt, & sub hoc respectu ad procreandos longos gravesque morbos magnam vim & potentiam habent. Acida etenim quæ maximam vim adstringentem obtinent, ipsam excretionem alvinam retardant, quod indubia docet experientia. Hinc rectè Hippocrates, lib. de diætâ. acetum alvum potius sistere quàm movere pronuntiat. Si illa sit actio adstringentium in corpore, nullum superest dubium quin effectum quam maximè nocuum, intus sumpta præsent in hæmorrhagiis; varia scilicet corporis fluida coagulando in vasis, motui circulatorio obices obicibus, præsertim capillaribus addunt, ita, ut si sistatur hæmorrhagia, morbum hæmorrhagiæ pejorem luctuosioreque promoveant. Ortum ducat hæmorrhagia, à causâ externâ, à rupturâ vel sectione alicujus venæ aut arteriæ, vel à debilitate nervosâ vel à relaxatione: nequaquam adhiberi rectè possunt adstringentia interna. Ex his quæ modò suprâ exposuimus, satis abundè patet, fore ut eorum actione hæmorrhagia potius incrementumumat, quam cohibeatur. Constricção enim intus systemate vasculoso & membranoso, fit plethora in ratione constrictionis, sanguis ex intus ad extus versus partem ubi minor adest resistentia urgetur, unde nova sanguinis fluxus causa.

UT verò nostræ propositionis veritas exemplis illustretur & remaneat incon-
 cussa, huc accedant duæ hæmorrhagiarum species, in quibus haud infre-
 quenter largâ manu exhibentur adstringentia. Hæmoptysis scilicet & uteri hæmor-
 rhagia. Accuratissimè hæmoptyseos causæ & symptomata perpendantur, ab illius
 curatione omninò exulari debere adstringentia palam fiet. Illa sanguinis excretio
 ferè nunquam à merâ simplicique plethorâ excitatur. Causa verò immediata sive
 proxima videtur esse inæqualis & impeditus sanguinis per vasa transitus, dum
 majori copiâ & impetu in arteriam pulmonalem ejusque ramulos affluit, quam
 venæ pulmonales eum recipere & ad cor reddere possunt, ita ut fiat tenuium
 vasorum, quæ substantiam cellularem vascularemque & ipsa bronchia perrep-
 tant, tensio & intumescencia; denique vel transudatio vel apertura, vel vio-
 lenta ruptio. Illud uberius confirmatur à signis & symptomatibus hunc morbum,
 antecedentibus & concomitantibus. Invadit illud malum per vices & quasi per pa-
 roxismos revertitur; conqueruntur ægri de horripilatione in cute, & in extremis
 præsertim pedibus, refrigeratione; vasa in manibus disparent, dolor in dorso,
 lassitudo & gravitas artuum afficit ægrum, alvus stricta, in pectore gravativus
 doloris sensus cum spirandi difficultate percipitur. Quid enim hæc omnia indicant,
 nisi spasmodicam externarum partium stricturem, & sanguinis versus partes inte-
 riores maioraque vasa repulsionem, ubi plus iusto coacervatur. Istæ tam inter-
 narum quam externarum partium constrictiones à spasmò oriæ, efficiunt inæqua-
 lem & impeditam sanguinis distributionem, unde illius impetuofus cursus &
 appulsus ad alia loca, præsertim versus pulmões, ubi minor datur resistentia,
 ob substantiæ pulmonalis laxiorem debilioremque contextum. Potest equidem pa-
 riter circuitus & distributio sanguinis inæqualis reddi, orgasmò, turgescentiâ, seu
 nimia rarefactione sanguinis intra canales, quibus systaltica & elastica vasorum vis
 minuitur aut demitur; unde congestio & stagnatio sanguinis in vasis textu laxiori
 contextis; atqui in nullâ aliâ parte quam in pulmonibus datur textus laxior. Nihil
 igitur mirum quod hæmoptylis tam frequens observetur, apud hypochondriacâ
 passione laborantes, necnon pathematibus hysterice obnoxias foemineas, in qui-
 bus ut plurimum, mensium fluxus sub multis & atrocibus spasmodis difficulter succe-
 dit. Variis quoque observationibus compertum habemus, quod infarctio vel ob-
 structio aliquo viscere sanguineo, præsertim liene caput exerat hæmoptylis. Ete-
 nim intercepto alicubi sanguinis per vasa transitu, ubi minor datur resistentia ma-
 jori copiâ confluit. Præterea corporis structura & ipsa disponit ad hæmoptysim.
 Quibus corpus gracile, collum longum, pectus angustum simulque depressum;
 fibræ tenuiores & laxiores, vasa debilia, una cum iis qui à parentibus phthisicis
 progeniti: hi plerumque sanguinis fluxum patiuntur. Cum his caulis concurrunt
 & sanguinis ipsius copia, si nimia sit; & acris constitutio, à calore enim corporis
 humani rarefiunt fluida in ratione majori quam solida relaxantur, unde turgescen-
 tia, extensio. A frigore intenso corporis superficies constringitur, sanguisque ad
 interiora compulsus, in pulmonum canalibus majori copiâ accumulatus, ea facile
 perrumpit vel transudat. Illis hæmoptyseos causis apprime cognitis & sedulo per-
 pensis, minimè quidem ad illas tollendas minuendas-ve virtute & facultate donari

adstringentia apud quemcunque manifestum erit, quia imò illorum usus has jam exsistentes causas adaugere vel potius excitare valet; vel si eâ dosi præscribuntur, & ita textum vascularem & cellularem, fibras, vasa constringunt, vel varia fluida præsertim sanguinem spissant & cogunt, ut sanguinis fluxus sistatur, in gravius lethaliusque malum ægrotantem demittunt. Inspissato enim sanguine vel constrictis vasorum apertorum extremitatibus ita ut oriatur immeabilitas & sanguis fluere jam nequeat: sanguinis à tergo irruentis resistentiâ major fit impetus, distentio augetur, majori irritatione crescit calor, febris excandescit, insurrectâ inflammatione suppuratio succedit. Quot equidem miseri ægri hæmoptysi simplici laborantes, ab improvise adstringentium usu, inter phthilicos dolores, tædia, cruciatus, horas trahunt miserrimas, sensumque sese in orcum delabi conspiciunt?

V.

QUID in uteri hæmorrhagiâ boni conferre valent adstringentia? possunt-ne tuto exhiberi? Quando hæc hæmorrhagia à copiosiori sanguinis ad uterum per arterias affluxu, inæquali vero & impedito per venas ad cor refluxu pendet; tunc enim coacervatur in vasis uteri, in totum systema vasculare perfunditur, nimium vasa distenduntur, relaxantur-ve, dehiscunt tandem & sanguinem elabi sinunt, interdum magnâ vi profundunt. Quid ab illorum usu emolumenti expectandum? Quando à plethorâ locali, vel, si vis, generali ita exuberante, ut non solum vasa interna deducat, sed & planè dilaceret. Quid? quando à congestione ipsius uteri vel à relaxatione debilitateque nervosâ fovetur. Nonne adione adstringentium in quocumque casu malum gravius fieret? Potior-ne ea adhibendi adest ratio, quando uteri hæmorrhagia ab activâ planè causâ profiscitur? A spasmoticis partium vasculosarum nervosarumque stricturis & contractionibus, quæ ad uterum majori copiâ sanguinem urgent; ut satis abundè patet, conspectis & attentè consideratis, quæ ut plurimum illam præcedunt & comitantur. Tensione scilicet & hypochondriorum inflatione, circa lumbos & dorsum dolore gravativo, sæpè cum sensu frigoris juncto, horripilationibus, colicis doloribus, extremarum partium refrigeratione, capitis dolore intenso, pulsu citiori & strictiori cum interiorum ardore. Securius-ne & cum majori ægrotantis emolumento adhiberentur quando, iste sanguinis fluxus pro causâ agnoscit, infarctum, congestionem in aliquo viscere, vel in ipsius uteri substantiâ, carnosas massas in utero genitas & adhærentes, quibus pars uteri correspondens, ita comprimitur, vel continuò irritatur, ut inde oriatur fluxio & tandem sanguinis fluxus foveatur. Hasce causas tollere vel minuere nequaquam valent adstringentia. Quin sæpius exacerbatum fuisse adstringentibus hunc fluxum sanguinis, compertum est. Quot equidem fœminæ, ab illorum improvise & immoderatiore usu, in immanes, chronicosque morbos, cachexiam, scilicet, hydropem, lentam & hecticam febrem, in perpetuum ex utero lymphæ acris stillicidium, in ulcus, in skirrum & uteri cancerum præcipitatas fuisse, sanâ docuit observatio.

Quæ de hæmoptysi & de uteri hæmorrhagiâ diximus, de aliâ quâcunque hæmorrhagiâ asseri possunt. Quando quidem ab iisdem & similibus causis omnes ortum ducant. At, inquires, acida, quæ ut ipse fateris insigni virtute adstringente donan-

tur, quotidie tamen à Medicis præclaræ doctrinæ in quibusdam hæmorrhagiis cum eventu feliciori exhibentur. Sane quidem, non iniicias ibo: sed illud tantum dici potest, de hæmorrhagiis à dissolutione sanguinis scorbuticâ, vel alia quacunque procreatis. In hoc verò casu, non tanquam adstringentia, sed tanquam alterantia præscribuntur. Acidorum enim virtute crasis sanguinis restituitur, vim suam tonicam fibræ & vaia recuperant, & sanguis fluere desinit.

Aliquot etiam à Medicis, non intimæ doctrinæ observationes allatæ, nostræ propositionis veritatem infringere viderentur. Hisce observationibus reipia, hæmorrhagias sumptis adstringentibus continuo cessavisse constat. At nonne istæ hæmorrhagiæ nullo assumpto remedio sponte desissent; sicut haud infrequenter observatum habetis. Vel si vi adstringentis sumpti revera cohibitæ fuerunt: nonne hæmorrhagiâ pejus & gravius ortum est malum? At saltem tuto & cum emolumento extus applicari possunt adstringentia. Vix eorum usus in hæmorrhagiâ omnino passivâ admitti potest; in activis verò nequaquam. Non tantummodo causas hæmorrhagiæ tollere vel minuere nequeunt, sed è contra sistendo sanguinem, congestionem, distensionem in parte, versus quam fit fluxio, augerent. Observatum est quod, hæmorrhagia narium, linimentis, dissolutione vitrioli albi imbutis, & in nares introductis, cohibita quidem fuerit; sed omnes faciei venæ admodum intumuerunt, comitantibus anxietate aliisque symptomatibus; gravis capitis dolor incessit, per os irruit sanguis, neque hæc omnia symptomata disparuere, quin sanguis de novo per nares effluerit. Ex his supra expositis invictè inducimur ad concludendum:

Ergo in omni hæmorrhagiâ adstringentia intus nociva.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Henricus-Hercules CHAMPAGNE DU FRESNAY.

M. Sthephanus CROCHET.

M. Joannes-Stanisl. MITTIÉ,
Regiæ Scientiarum & Litterarum Nanceii Acad. Socius, necnon Stanislai I, Polonia-
rum Regis olim Medicus ordinarius.

M. Petrus LASERVOLLE, Chirurgiæ latino idiomate Professor designatus in annos 1788-89, Seren. Atrebatum Principis Medicus Consiliarius.

M. Claudius-Ludovicus BERTHOLLET, Academiæ Regiæ Scientiarum Socius.

M. Carolus-Ludov.-Franciscus ANDRY.

M. Paul-Augustinus-Olivarius MAHON DE HOUSSAY, Chirurgiæ, Gallico idiomate Professor, in annos 1788-89, designatus.

M. Joannes THERY.

M. Joannes-Baptista Alexander MAIGRET.

Proponebat Parisiis **JACOBUS - AMBROSIVS LAUBRY**, Rhemus, Doctor Rhemenfis, nec-non Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis Baccalaureus, Theseos Auctor.

A. R. S. H. 1788. AB OCTAVA AD MERIDIEM.

Typis **QUILLAU**, Universitatis & Facultatis Medicinæ Typographi,
viâ dictâ du Fouarre, 1788.

